

# Porosty workowe Puszczy Noteckiej

2015-09-02

1 września 2015 r. w ramach realizowanej współpracy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z uczelniami wyższymi, odbyło się spotkanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Jana Rydzanica z Przewodniczącym ds. Dydaktyki Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Zamiejskiego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim dr Piotrem Grochowskim – specjalizującym się m.in. w porostach zwanych inaczej grzybami zlichenizowanymi, którego tematem była ochrona tych wyjątkowych organizmów, porastających wiele obszarów naturalnych, wyznaczonych w województwie lubuskim. W spotkaniu uczestniczył również Regionalny Konserwator Przyrody Wincenty Piworon i Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Stanisław Bąkowski.

Podczas spotkania odbył się wyjazd terenowy do Puszczy Noteckiej, na obszarze której zlokalizowany jest obszar Natura 2000 PLH080032 Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej. Obszar posiada aktualny plan zadań ochronnych.

Obszar, Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej, pełni w skali kraju istotne znaczenie dla ochrony siedliska przyrodniczego 91T0 Sosnowy bór chrobotkowy (*Cladonia-Pinetum* i chrobotkowa postać *Peucedano-Pinetum*) oraz gatunku jakim jest wilk. Oba ww. elementy przyrodnicze, ujęte zostały w załączniku I i II Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, a także wyszczególnione zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000.

W trakcie wizji terenowej dokonywano identyfikacji porostów workowych, głównie z rodziny chrobotkowatych. Oceniono również czytelność oznakowania obszaru oraz aktualny stan ochrony porostów, w części obszaru objętej lustracją.

Chrobotki należące do podrodzaju *Cladina* to krzaczkowate porosty naziemne barwy szaropopielatej, żółtozielonkawej lub sinawoszarej, u których nie obserwuje się plechy podstawowej, gdyż zanika ona bardzo szybko, we wczesnych etapach wzrostu. Poszczególne gatunki w podrodzaju *Cladina* różnią się od siebie kolorystycznie oraz morfologicznie.

W Polsce występuje 7 gatunków chrobotków należących do podrodzaju *Cladina*. Najczęściej występują one wspólnie w typowych dla nich siedliskach. Rosnąc tworzą zwarte lub luźne płyty runa.



## Wizja terenowa Borów Chrobotkowych w Puszczy Noteckiej – 2 września 2015 r.

